




MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS - CES  
Concurso Público (Aplicação: 17/08/2008)  
Cargo: ENFERMEIRO/Nível E

**LEIA ATENTAMENTE AS SEGUINTE INSTRUÇÕES:**

- Verifique, nos espaços devidos do CARTÃO-RESPOSTA, se o número de controle é o mesmo que está ao lado do seu nome na folha de chamada. Caso o número de controle não corresponda ao que está nessa folha, comunique imediatamente ao fiscal de prova. Não se esqueça de assinar seu nome no primeiro retângulo.
- Marque as respostas das questões no CARTÃO-RASCUNHO, a fim de transcrevê-las, com caneta esferográfica preta, de ponta grossa, posteriormente, no CARTÃO-RESPOSTA.
- Não pergunte nada ao fiscal, pois todas as instruções estão na prova. Lembre-se de que uma leitura competente é requisito essencial para a realização da prova.
- Não rasure, não amasse nem dobre o CARTÃO-RESPOSTA, para que ele não seja rejeitado pela leitora.



Lê o texto a seguir acerca da patrona da enfermagem brasileira.



Ana Justina Ferreira Néri (1814 – 1880) nasce na vila de Cachoeira de Paraguaçu. Viúva do capitão-de-fragata Isidoro Antônio Néri, não se conforma em ver os três filhos – o cadete Pedro Néri e os médicos Isidoro e Justiniano – e mais dois irmãos, ambos oficiais do Exército, serem convocados para a Guerra do Paraguai.

Escreve ao presidente da província uma carta na qual oferece seus serviços como enfermeira por todo o tempo em que durasse o conflito. Deixa a Bahia, pela primeira vez na vida, em 1865 e vai auxiliar o corpo de saúde do Exército. Trabalha no hospital de Corrientes, onde conta com a ajuda de poucas freiras vicentinas para cuidar de mais de 6 mil soldados internados. Na capital paraguaia, então ocupada e sitiada pelo exército brasileiro, monta uma enfermaria-modelo, utilizando para isso recursos financeiros pessoais herdados da família.

Volta ao Brasil em 1870, recebendo várias homenagens, entre elas as condecorações com as medalhas de prata humanitária e de campanha. Recebe do imperador dom Pedro II uma pensão vitalícia, com a qual educa quatro órfãos recolhidos no Paraguai. Morre no Rio de Janeiro. Em sua homenagem, Carlos Chagas batiza com seu nome a primeira escola oficial brasileira de enfermagem de alto padrão, em 1926.

Adaptado de Almanaque Abril. **QUEM É QUEM NA HISTÓRIA DO BRASIL**. São Paulo, Abril Multimídia, 2000.

## 01

Lê as afirmativas.

Ana Néri

- I) iniciou uma enfermaria, que era um modelo, usando seus próprios fundos.
- II) deu início a uma enfermaria, que se tornou um modelo, usando fundos do governo brasileiro.
- III) criou a primeira escola oficial brasileira de enfermagem.
- IV) criou a escola de enfermagem de alto padrão.
- V) exerceu seu trabalho fora do país.

Está(ão) correta(s) a(s) afirmativa(s)

- (a) I e III.
- (b) I e V.
- (c) II e IV.
- (d) III e V.
- (e) IV e V.

## 02

A expressão “então ocupada e sitiada pelo exército brasileiro”, no segundo parágrafo, **NÃO MODIFICARIA** o sentido global do texto se fosse substituída por

- (a) “onde se situava o exército do Brasil.”
- (b) “que as forças brasileiras ocupariam logo após.”
- (c) “em que o exercido brasileiro construiria sítios.”
- (d) “a ser ocupada pelo exército nacional.”
- (e) “onde estava o exército brasileiro àquela época.”

## 03

**HAVERIA ALTERAÇÃO** no sentido do segundo parágrafo se o fragmento “... por todo o tempo em que durasse o conflito” fosse substituído por

- (a) “durante toda a guerra”.
- (b) “até a duração do conflito”.
- (c) “por todo o tempo que a guerra durasse”.
- (d) “pelo período até o término da guerra”.
- (e) “até terminar a contenda”.

Lê as afirmativas.

- I) Ana Néri tinha outras cinco pessoas da família envolvidas na guerra.
- II) Ana Néri era uma pessoa cosmopolita, que havia viajado muito.
- III) O presidente pede a Ana Néri que se envolva no cuidado dos pacientes.
- IV) Algumas religiosas ajudam Ana Néri a cuidar dos pacientes.
- V) Corrientes não se manteve alheia à guerra.

#### Estão corretas as afirmativas

- (a) II, III e V.
- (b) II, III e IV.
- (c) I, IV e V.
- (d) III, IV e V.
- (e) I, III e V.

Lê o seguinte artigo a respeito de um tema polêmico.

### **“POSICIONAMENTO DA ABEN SOBRE A RELEVÂNCIA SOCIAL E CIENTÍFICA DA EXPERIÊNCIA BRASILEIRA DE IMPLANTAÇÃO DA POLÍTICA DE CENTROS DE PARTO NORMAL**

#### **I Considerações Iniciais**

A gestação, o parto e o nascimento são momentos únicos na vida de uma mulher e sua família. Tempos de espera, de profundas transformações no corpo, nas emoções e nas expectativas em relação à chegada do bebê. Em todas as sociedades, a gestação/parto é cercado de muitos cuidados e mesmo sendo eventos biológicos universais, a forma como eles acontecem sofrem modificações importantes de acordo com cada cultura. No mundo contemporâneo tem passado de um evento familiar, que acontecia no domicílio, com todo suporte emocional de parentes e amigos, para ser um evento médico, que ocorre em hospitais, com uso de muita tecnologia.

Para o movimento de mulheres este modo de atenção ao parto é um modelo médico-centrado e embasado numa concepção do feminino como condição

essencialmente defeituosa e que, com base nesse juízo, trata o parto como patológico e arriscado utilizando tecnologia agressiva, invasiva e potencialmente perigosa. E por outro lado, suprimindo e ignorando as dimensões sexuais, sociais e espirituais do parto e do nascimento (BWHBC, 1993, p.398).

No caso brasileiro, a assistência ao parto deve ser compreendida no contexto de um conjunto complexo de fatores característicos da atenção à saúde reprodutiva, que inclui índices de esterilização e partos cirúrgicos dos mais elevados do mundo. O alto índice de hospitalização do parto, conforme Berquó e cols. (apud DINIZ, 2001), não tem assegurado à qualidade da atenção, uma vez que o despreparo dos profissionais para a atenção ao parto normal, somado ao sucateamento da rede pública, geram riscos até mesmo para mulheres saudáveis e tem impacto na situação de morbimortalidade materna e fetal. Submeter-se a uma cirurgia tornou-se recurso comum no país, tanto para ter como para evitar filhos: promovendo a institucionalização de um processo de medicalização no corpo feminino e de mediação cirúrgica na vida reprodutiva (IRRRAG apud DINIZ, 2001).

Nos anos 90 o modelo vigente de assistência ao parto no Brasil recebe críticas que destacam as circunstâncias de violência e constrangimento em que se dá a assistência, especialmente as condições pouco humanas a que são submetidas mulheres e crianças no momento do nascimento. No parto vaginal, a violência da imposição de rotinas, da posição de parto e das interferências obstétricas desnecessárias perturbam e inibem o desencadeamento natural dos mecanismos fisiológicos do parto, que passa a ser sinônimo de patologia e de intervenção médica, transformando-se em uma experiência de terror, impotência, alienação e dor. Desta forma, não surpreende que as mulheres introjetem a cesária como melhor forma de dar à luz, sem medo, sem risco e sem dor. (REHUNA, apud DINIS, 2001).

[...]

[http://www.abennacional.org.br/download/artigo\\_jornal\\_casasdeparto.pdf](http://www.abennacional.org.br/download/artigo_jornal_casasdeparto.pdf)

#### 05

O presente artigo apresenta algumas incorreções à luz dos preceitos da gramática normativa. Analisa as afirmações a seguir acerca de trechos do primeiro parágrafo.

- I) O trecho “Em todas as sociedades, a gestação/parto é cercado” estaria mais de acordo com o padrão caso fosse escrito “Em todas as sociedades, a(o) gestação/parto é cercada(o)”.

- II) O trecho “A gestação, o parto e o nascimento são momentos únicos na vida de uma mulher e sua família” apresenta a incorreção de não haver reiterado a preposição “de” no excerto “e sua família”.
- III) O trecho “com todo suporte emocional de parentes e amigos” adequar-se-ia mais ao padrão caso fosse escrito “com todo o suporte emocional de parentes e amigos”.

**Quanto às afirmativas,**

- (a) a I e a III estão corretas.  
(b) apenas a I está correta.  
(c) a II e a III estão incorretas.  
(d) a I e a II estão incorretas.  
(e) apenas a II está correta.

**06**

**Ainda no primeiro parágrafo, a construção “tem passado” preservaria o sentido original do texto caso fosse substituída por**

- (a) “teria passado”.  
(b) “tivesse passado”.  
(c) “vem passando”.  
(d) “tinha passado”.  
(e) “estaria passando”.

**07**

**De acordo com o texto, a cesária acaba sendo vista como a melhor alternativa pelas mulheres em virtude de vários fatores, SENÃO**

- (a) do fato de ser o parto um evento biológico universal.  
(b) das condições pouco humanas da parturiente na situação em tela.  
(c) da inibição dos mecanismos fisiológicos do parto decorrente dos procedimentos utilizados.  
(d) da institucionalização de um processo de medicalização do corpo da parturiente.  
(e) da mediação cirúrgica na vida reprodutiva.

**08**

Podemos perceber, ao longo do texto, problemas de concordância na flexão do verbo. **Assinala a alternativa que apresenta uma proposta de correção de acordo com os preceitos da gramática normativa.**

- (a) “que as mulheres introjetem a cesária” por “que as mulheres introjetam a cesária”. (4º par.)  
(b) “O alto índice de hospitalização do parto, conforme Berquó e cols. (apud DINIZ, 2001), não tem assegurado” por “O alto índice de hospitalização do parto, conforme Berquó e cols. (apud DINIZ, 2001), não assegurou”. (3º par.)  
(c) “No parto vaginal, a violência da imposição de rotinas, da posição de parto e das interferências obstétricas desnecessárias perturbam e inibem o desencadeamento” por “No parto vaginal, a violência da imposição de rotinas, da posição de parto e das interferências obstétricas desnecessárias perturba e inibe o desencadeamento”. (4º par.)  
(d) “a forma como eles acontecem sofrem modificações importantes de acordo com cada cultura” por “a forma como eles acontecem por sofrerem modificações importantes de acordo com cada cultura”. (1º par.)  
(e) “E por outro lado, suprimindo e ignorando as dimensões sexuais, sociais e espirituais do parto e do nascimento” por “E por outro lado, suprimem-na, ignorando as dimensões sexuais, sociais e espirituais do parto e do nascimento”. (2º par.)

09

A enfermagem é uma profissão comprometida com a saúde e a qualidade de vida da pessoa, família e coletividade. **O que regulamenta o exercício da enfermagem é a Lei n.º:**

- (a) 5.321/87
- (b) 8.080/90
- (c) 4.558/91
- (d) 7.498/86
- (e) 2.598/76

10

**Em relação à biossegurança é correto afirmar que**

- (a) luvas de procedimentos não estéreis – em geral ambidestras e de menor custo nunca são suficientes para os objetivos das Normas de Biossegurança.
- (b) os profissionais de saúde devem estar vacinados contra a Hepatite B.
- (c) em caso de exposição percutânea ou exposição de mucosas deve-se lavar o local exaustivamente com hipoclorito e glutaraldeído.
- (d) o uso do coletor de material perfurocortante deve considerar o limite de capacidade determinado a 5 cm da parte superior do coletor.
- (e) a exposição ao líquido amniótico não constitui critério para utilização de proteção do trabalhador de saúde.

11

Sr. Francisco procura a Unidade Básica de Saúde com cefaléia e dor abdominal. É informado, na recepção do serviço, que não poderá ser atendido, uma vez que é morador da cidade vizinha. Sr. Francisco procura então o pronto socorro onde é atendido e diagnosticada uma gastroenterite. **Entende-se que o ocorrido com o Sr. Francisco fere o seguinte princípio do SUS:**

- (a) integralidade
- (b) controle social
- (c) regionalização
- (d) universalidade
- (e) interdisciplinabilidade

12

Sobre as vacinas utilizadas na rede pública de saúde no Brasil é correto afirmar que

- I) os eventos adversos podem ser os esperados, tendo em vista a natureza e características do imunobiológico, ou inesperados.
- II) eventos adversos por Reações de tipo I, anafiláticas, mediadas por IgE são mais frequentes em indivíduos alérgicos. Podem ocorrer após qualquer vacina ou soro, especialmente os de origem não-humana (equina).
- III) o termômetro de máxima e mínima deve ser colocado na primeira prateleira, na geladeira da UBS, junto às vacinas dT, DTP, Hepatite B, Hib, influenza, TT e BCG
- IV) uma contra-indicação geral de uso de vacinas ocorre quando a criança está em tratamento, recebendo 1,5mg/kg/dia de prednisona há três semanas.
- V) a vacina HIB é aplicada a partir de dois meses de idade, por via subcutânea e é descrita como Vacina contra *Haemophilus influenzae* do tipo a.

**Estão corretas as afirmativas**

- (a) III e IV tão-somente.
- (b) II, III e V tão-somente.
- (c) I e II tão-somente.
- (d) III, IV e V tão-somente.
- (e) I, II, III, IV e V.

13

Sr. Antonio vai à Unidade de Saúde da Família para buscar insulina simples. A enfermeira checa no prontuário e observa que ele utiliza 12 U.I subcutânea, duas vezes ao dia e a Unidade dispõe de insulina 100U.I/ml em frascos de 5 ml. **Quantos frascos de insulina o Sr. Antonio receberá para tratamento de 30 dias?**

- (a) 7 frascos-ampola.
- (b) 8 frascos-ampola.
- (c) 2 frascos-ampola.
- (d) 5 frascos-ampola.
- (e) 3 frascos-ampola.

**14**

Sobre as teorias de enfermagem é correto afirmar que

- I) as teorias se constituem em um referencial exclusivamente dirigido ao diagnóstico de enfermagem.
- II) em cada teoria encontramos um conjunto diferenciado de elementos que definem a linha teórica das áreas fisiológicas.
- III) o conceito de pessoa é utilizado exclusivamente pela teoria de Nightingale.
- IV) cada teoria orienta uma forma de avaliar e atuar junto aos usuários do sistema de saúde.

**Está(ão) correta(s)**

- (a) apenas a I e a III.
- (b) apenas a II e a IV.
- (c) apenas a II.
- (d) apenas a IV.
- (e) I, II, III e IV.

**15**

A central de material esterilizado é destinada à recepção e ao expurgo, preparo e esterilização, à guarda e distribuição de material para o centro cirúrgico e demais unidades da instituição. São atribuições do enfermeiro:

- I) Supervisionar e controlar as atividades desenvolvidas em cada área da central de material esterilizado.
- II) Desinfetar e separar os materiais dos diferentes setores do hospital.
- III) Efetuar regularmente testes bacteriológicos nos aparelhos de esterilização, avaliar e divulgar os resultados.
- IV) Circular em sala de cirurgia e instrumentar.
- V) Esclarecer dúvidas do paciente e familiar acerca da cirurgia.

**Estão corretas apenas as afirmativas**

- (a) I e III.
- (b) II, III e IV.
- (c) I, II e V.
- (d) III e IV.
- (e) III e V.

**16**

**Quanto às soluções utilizadas em terapia intravenosa é correto afirmar que**

- (a) o soro fisiológico a 2% é um exemplo de solução que aumenta o soluto no plasma, sendo classificada como hipertônica.
- (b) as soluções hipertônicas provocam uma expansão das células, diluindo a concentração do soluto do plasma.
- (c) a glicose a 5% em solução fisiológica a 0,9% é uma solução hipotônica.
- (d) as soluções isotônicas apresentam a mesma pressão osmótica do plasma e o soro glicosado a 5% é um exemplo.
- (e) a pressão osmótica do plasma repele a água da célula através da membrana impermeável.

**17**

São consideradas complicações importantes para o paciente em uso de diálise peritoneal ambulatorial contínua (CAPD):

- I) Obstrução do cateter e extravasamento do dializado
- II) Náuseas, hipervolemia, hipovolemia, infecção no local de saída e túnel
- III) Isquemia da mão, infecção e coagulação do cateter
- IV) Liberdade, independência física e psicológica
- V) A duração da diálise depende da gravidade da condição bem como do tamanho e peso do paciente para fazer o cálculo de heparina

**Estão corretas as afirmativas**

- (a) I e IV tão-somente.
- (b) I e II tão-somente.
- (c) II, III e IV tão-somente.
- (d) I, IV e V tão-somente.
- (e) I, II, III e V tão-somente.

Sra. Carla, paciente da UTI geral, encontra-se em uso de respirador. **Em relação à ventilação mecânica é correto afirmar que**

- (a) a extubação precoce é preferível mesmo frente à possibilidade de reintubação.
- (b) é adequada a redução gradual do suporte ventilatório com vistas ao desmame.
- (c) o cuidado de enfermagem dispensa o conhecimento dos parâmetros utilizados na ventilação mecânica.
- (d) a duração da ventilação mecânica está diretamente relacionada a uma série de complicações que incluem pneumonia, lesão de via aérea e fraqueza muscular.
- (e) o aumento da pressão das vias aéreas pode estar relacionado a melhora da complacência.

**A Sondagem Nasogástrica tem as seguintes finalidades:**

- (a) lavagem, gavagem e irritação gástrica
- (b) eliminação, descompressão, alimentação e lubrificação
- (c) descompressão, alimentação, compressão e lavagem
- (d) aspiração, remoção e equilíbrio hidroeletrólítico
- (e) irrigação, lavagem e equilíbrio ácido-básico

A enfermeira observa o paciente em pós-operatório e identifica dores agudas e cortantes no tórax, ansiedade, cianose, dilatação das pupilas, sudorese profunda, pulso rápido e irregular. **Trata-se de**

- (a) trombose venosa profunda, e a enfermeira deve interromper a infusão medicamentosa.
- (b) embolia pulmonar, e a enfermeira deve administrar oxigênio.
- (c) hemorragia, e a enfermeira deve diminuir a velocidade de infusão intravenosa.
- (d) uma coagulopatia, e a enfermeira deve controlar a policitemia.
- (e) um delírio, e o paciente deve ser sedado.

**Em relação aos ferimentos e sua cicatrização é correto afirmar que**

- (a) a granulação deve ocorrer em casos de queimadura e úlceras.
- (b) a fase de proliferação é a última fase da cicatrização da ferida.
- (c) os leucócitos polimorfonucleares são repelidos pela prostaglandina, na fase inflamatória.
- (d) lacerações são produzidas por instrumentos pontiagudos.
- (e) a cicatrização por primeira intenção nunca forma quelóide.

Sr. João, 50 anos, casado, pai de cinco filhos, foi admitido na clínica cirúrgica do Hospital São Jorge para realizar uma Laparotomia exploratória. Identifique a alternativa que apresenta as orientações dadas pelo enfermeiro, no período pré-operatório, para serem seguidas pelo Sr. João no período pós-operatório.

- I) Fazer exercício respiratório, deambulação precoce, exercícios de flexão e extensão para pernas e pés.
- II) Observar o nível de ansiedade, detectar sudorese, taquicardia, insônia e hipertensão.
- III) Avaliar o hábito intestinal e observar a presença de depressão respiratória.
- IV) Remover próteses dentárias, evitar enfisema pulmonar e administrar O<sub>2</sub>.
- V) Informar sobre a presença de dor, sangramento, náuseas ou vômitos e sinais de retenção urinária.

**Estão corretas somente as afirmativas**

- (a) I, II e V.
- (b) I e V.
- (c) III e V.
- (d) II, III e IV.
- (e) I e IV.



A enfermeira da unidade clínica do Hospital municipal encontra Joana, internada há 7 dias, com um diagnóstico de retocolite e recebendo terapia intravenosa no membro superior direito (cefálica mediana). Ao avaliar a infusão, observa edema, calor e hiperemia. **Diante desse quadro é correto afirmar que**

- (a) a enfermeira deve retirar o acesso venoso e aplicar compressas frias no local.
- (b) a bacteremia aumenta em aproximadamente 20 vezes o risco de tromboflebite.
- (c) a velocidade da infusão deve ser aumentada para favorecer a diluição da solução.
- (d) o paciente deve ser colocado em decúbito lateral direito e a cabeceira do leito deve ser elevada, em caso de embolia gasosa decorrente da entrada de ar no cateter.
- (e) o paciente não apresenta sensibilidade ou dor no trajeto da veia, em caso de tromboflebite.

A Sra. Maria foi admitida em uma unidade de clínica médica, em um hospital de ensino, com diagnóstico de leucemia linfocítica aguda. **Identifique o plano de cuidados de enfermagem que devem ser prestados à cliente.**

- (a) Realizar procedimentos invasivos como sondagem vesical e fleet enema em caso de constipação.
- (b) Observar a presença de tromboflebite de veia profunda, infarto do miocárdio e oclusão trombótica das veias esplênica, hepática, porta e mesentérica.
- (c) Monitorar os sinais vitais de 4 em 4 horas, observar presença de petéquias e sangramento na gengiva e narinas, avaliar alterações de inquietação, irritabilidade, confusão e cefaléia.
- (d) Avaliar a dieta para a inclusão de alimentos ricos em ácido fólico, estimular a manter as atividades diárias e evitar período de repouso no leito.
- (e) Observar a presença da hipertrofia indolor dos linfonodos, comprometimento pulmonar hepático ou ósseo e obstrução da veia cava superior.

Constituem-se ações de avaliação e intervenção de enfermagem junto ao paciente oncológico:

- I) avaliar o tipo de dor do paciente quanto à localização, duração e qualidade; usar uma escala de intensidade da dor que vai de 0 (ausência de dor) a 10 (pior dor possível); explorar intervenções para a dor que tenham sido usadas e sua eficácia.
- II) orientar o paciente para preferir alimentos quentes e sólidos frente às alterações da mucosa oral, pós radioterapia.
- III) reconhecer que o processo de formação do câncer desde uma célula cancerosa até um tumor visível segue os estágios de iniciação, promoção e progressão.
- IV) o enfermeiro deve permanecer com o paciente durante a realização do procedimento de radioterapia, oferecendo conforto e apoio.

#### Estão corretas

- (a) somente I e III.
- (b) somente II e IV.
- (c) somente II e III.
- (d) somente I, III e IV.
- (e) I, II, III e IV.

Durante um atendimento no pronto-socorro, a enfermeira Ana realiza um exame físico na Sra. Josefina, 40 anos, trazida ao serviço após atropelamento em via pública, causado por uma moto. **Durante o exame identifica anisocoria, que significa**

- (a) laceração profunda da pálpebra.
- (b) hemorragia conjuntival importante.
- (c) nistagmo.
- (d) neurofibrose.
- (e) desigualdade do diâmetro ocular.

**Em relação ao estatuto do idoso é correto afirmar que**

- (a) os casos de suspeita de maus-tratos contra idoso serão eventualmente comunicados pelos profissionais de saúde a quaisquer dos seguintes órgãos: autoridade policial, Ministério Público ou Conselhos do Idoso.
- (b) é vedada a discriminação do idoso nos planos de saúde pela cobrança de valores diferenciados em razão da idade.
- (c) somente ao idoso é assegurado o direito de optar pelo tratamento de saúde que lhe for reputado mais favorável, independentemente de sua condição física ou mental.
- (d) é vedado atendimento domiciliar de idosos, incluindo a internação, para a população que dele necessitar e esteja impossibilitada de se locomover, nos casos de idosos abrigados e acolhidos por instituições filantrópicas.
- (e) é contra-indicada a permanência em tempo integral de familiares e/ou acompanhantes nos casos de internação de idosos por doença grave.

**Em relação à saúde do idoso é correto afirmar que**

- (a) a principal causa de quedas é decorrente dos riscos ambientais, acarretando tropeções e escorregões dos idosos com mais de 75 anos.
- (b) todos os idosos devem ser orientados a reduzir sua movimentação para evitar quedas e fraturas.
- (c) a queda em idosos é mais freqüente entre homens.
- (d) ambientes monocromáticos, com vários tons de uma mesma cor em paredes, móveis e tapetes favorecem a prevenção da queda em idosos.
- (e) a principal causa de internação aguda por queda ocorre por fratura de colo de fêmur.

**Em relação às doenças infecto-contagiosas é correto afirmar que**

- I) a coccidioidomicose é uma micose sistêmica, predominantemente pulmonar, que pode, também, comprometer pele, laringe, ossos, articulação, meninges, entre outros. São sinais mais freqüentes: comprometimento respiratório

baixo, febre, sudorese noturna, dor pleural, dispnéia, tosse produtiva, artralgia, anorexia.

- II) a fase paroxística da coqueluche se caracteriza por febre baixa ou afebril. A manifestação típica são os paroxismos de tosse seca (durante os quais o paciente não consegue inspirar e apresenta protusão da língua, congestão facial e, eventualmente, cianose com sensação de asfixia). Essa fase dura de 2 a 6 semanas.
- III) o diagnóstico diferencial da dengue inclui gripe, rubéola, sarampo, infecções virais e bacterianas, choque endotóxico, leptospirose, febre amarela, hepatites infecciosas e outras febres hemorrágicas.
- IV) as complicações da difteria incluem miocardite, neurites periféricas, nefropatia tóxica, insuficiência renal aguda.

**Estão corretas as afirmativas**

- (a) I, II e III tão-somente.
- (b) I e II tão-somente.
- (c) II, III e IV tão-somente.
- (d) III e IV tão-somente.
- (e) I, II, III e IV.

Apesar dos recursos disponíveis no Brasil em relação ao controle de câncer de colo de útero, a mortalidade pouco reduziu nos últimos anos. Em relação aos fatores de risco,

- I) o principal é a infecção pelo vírus do Papiloma Humano.
- II) a faixa etária de maior risco concentra-se entre 40 e 60 anos.
- III) a condição sócio-econômica não influi na distribuição da doença.
- IV) o uso de contraceptivos orais se constitui em fator de risco.

**Está(ão) correta(s)**

- (a) I e IV tão-somente.
- (b) I, II e IV tão-somente.
- (c) I tão-somente.
- (d) IV tão-somente.
- (e) I, II, III e IV.

31

**Em relação à política de saúde mental no Brasil, é correto afirmar que**

- (a) os Centros de Atenção Psicossocial são serviços complementares aos hospitais psiquiátricos.
- (b) os CAPS são serviços disponíveis para municípios de até 20.000 habitantes.
- (c) a internação psiquiátrica em hospital geral é contra-indicada nos casos em que há risco de suicídio.
- (d) o NASF – Núcleo de Apoio à Saúde da Família – não inclui profissionais especializados em saúde mental.
- (e) os CAPS são serviços substitutivos aos hospitais psiquiátricos.

32

**O processo de trabalho em enfermagem, no que se refere ao subprocesso administração tem como**

- (a) instrumentos: instrumental cirúrgico.
- (b) agentes: funcionários da administração.
- (c) métodos: teorias de enfermagem.
- (d) finalidade: coordenar a assistência de enfermagem.
- (e) produtos: recursos físicos e materiais.

33

**Frente a um paciente com risco de suicídio identifique as ações que o enfermeiro deve realizar:**

- (a) ouvir; ser afetuoso; levar a situação a sério; verificar o grau de risco e remover os meios, se possível.
- (b) perguntar sobre tentativas anteriores; explorar outras saídas, além do suicídio; falar que tudo vai ficar bem; fazer o problema parecer trivial.
- (c) levar a situação a sério e verificar o grau de risco; falar que tudo vai ficar bem; jurar segredo.
- (d) perguntar sobre o plano de suicídio; ganhar tempo – fazer um contrato; desafiar a pessoa a continuar em frente.
- (e) tomar atitudes, contar a outros, conseguir ajuda; jurar segredo; ouvir; ser afetuoso.

34

**Em relação ao controle de câncer de mama é correto afirmar que**

- (a) mulheres com história familiar de pelo menos um parente de terceiro grau com diagnóstico de câncer definem um grupo populacional com risco elevado de desenvolvê-lo.
- (b) a indicação de exame clínico de mama e mamografia anual, a partir dos 35 anos, deverá ser apenas para as mulheres pertencentes a grupos populacionais com risco elevado de desenvolvê-lo.
- (c) mulheres com história familiar de câncer de mama masculino não constituem fator de risco para câncer de mama.
- (d) história familiar de câncer de ovário não constitui fator de risco para câncer de mama.
- (e) a modalidade terapêutica disponível para o estadiamento do câncer de mama é principalmente a hormonioterapia.

35

O programa nacional de triagem neonatal do Ministério da Saúde recomenda a realização de exames no RN. Em relação a esse programa podemos afirmar que

- I) ele visa a prevenir um erro inato do metabolismo, cujo padrão de herança é autossômico recessivo e leva ao acúmulo do aminoácido Fenilalanina (FAL) no sangue e também ao aumento da excreção urinária de Ácido Fenilpirúvico e de Fenilalanina.
- II) ele pretende reduzir as doenças imunopreveníveis como hepatite e poliomielite.
- III) ele não inclui a triagem de hipotireoidismo congênito.
- IV) a triagem permite identificar os portadores de traço falciforme.

**Estão corretas as afirmativas**

- (a) II e III tão-somente.
- (b) III e IV tão-somente.
- (c) I, III e IV tão-somente.
- (d) I e IV tão-somente.
- (e) I, II, III e IV.

**Em relação ao atendimento de crianças no primeiro ano de vida é correto afirmar que**

- (a) é importante, em atendimentos a crianças com 2 meses que buscam a UBS com alguma queixa, questionar acerca dos quatro sintomas principais: tosse ou dificuldade para respirar, diarreia, febre e dor abdominal.
- (b) uma criança de 10 meses se apresenta inquieta, irritada, com olhos fundos, bebe avidamente e, quando submetida ao exame do sinal da prega, sua pele volta lentamente ao estado anterior. Sua condição de saúde é avaliada como desidratação grave.
- (c) crianças no primeiro ano de vida, que apresentam diarreia e vômitos, não devem participar de campanha de vacinação contra a poliomielite.
- (d) o soro antidiftérico não é compatível com a amamentação.
- (e) o indicador que melhor retrata o que ocorre durante a fase fetal é o peso de nascimento da criança. Pesos ao nascer menores que 2.500 g podem ser decorrentes de prematuridade e/ou déficit de crescimento intra-uterino.

## 37

O diabetes pode ser classificado como diabetes mellitus insulino dependente e diabetes mellitus não insulino dependente. **Acerca do diabetes tipo 1 é correto afirmar que**

- (a) 90% dos pacientes diabéticos são do tipo 1.
- (b) há presença de componente hereditário, frequentemente associado à obesidade, fadiga e infecção recorrente.
- (c) apresenta evolução lenta e má cicatrização de feridas.
- (d) 5% a 10% dos pacientes diabéticos são do tipo 1.
- (e) tem maior frequência em adultos com mais de 30 anos.

## 38

Sr. Pedro, 60 anos, procurou a UBS para controle de pressão arterial. Ao ser atendido pelo enfermeiro ficou evidenciado que ele necessitava imediatamente de um atendimento de emergência, pois apresentava um quadro de acidente vascular cerebral (AVC). **Identifique os sinais e sintomas que estão relacionados ao AVC:**

- (a) fraqueza e dormência no membro superior direito, amaurose fugaz, afasia e convulsão
- (b) rigidez de nuca, náuseas, tontura, papiledema

- (c) cefaléia, hipertermia, erupções purpúricas, petéquias e má alimentação
- (d) hipotermia, náuseas, alterações da personalidade, ataxia, vida sedentária
- (e) diminuição do nível de consciência, déficits hemisensoriais, abscesso dentário e tabagismo

## 39

A agente comunitária de saúde retorna à UBS solicitando prioridade para uma visita domiciliar à Sra. Francisca, uma vez que ela estava com falta de ar e com pele fria. A enfermeira imediatamente se organiza levando consigo os equipamentos básicos (estetoscópio, esfigmomanômetro e termômetro). Ao chegar à residência encontra a Sra. Francisca sentada em uma poltrona da sala, apresentando inquietação, confusão mental, frequência cardíaca crescente, pulso periférico fraco e filiforme, pressão sistólica baixa (80 mmHg ou 30 mmHg abaixo dos níveis anteriores), fadiga, dispnéia e oligúria. **Os sinais e sintomas apresentados pela Sra. Francisca são característicos de**

- (a) endocardite reumática.
- (b) miocardite.
- (c) choque cardiogênico.
- (d) pericardite.
- (e) insuficiência cardíaca congestiva.

## 40

Em um pré-natal pode-se afirmar acerca da medida da altura uterina que

- I) o Indicador é a relação entre altura uterina e o número de semanas de gestação.
- II) é considerado parâmetro de normalidade para o crescimento uterino o percentil 10, para o limite inferior.
- III) é considerado parâmetro de normalidade para o crescimento uterino o percentil 70, para o limite superior.
- IV) a medida da altura uterina é feita em centímetros com uma fita métrica flexível e não extensível, do púbis ao umbigo, com a grávida em decúbito dorsal.

**Estão corretas as afirmativas**

- (a) I, II e III tão-somente.
- (b) II, III e IV tão-somente.
- (c) II e III tão-somente.
- (d) I e II tão-somente.
- (e) I, II, III e IV.