



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS - CES
Concurso Público (Aplicação: 02/04/2006)
Cargo: AUXILIAR DE ENFERMAGEM/NI

LEIA ATENTAMENTE AS SEGUINTE INSTRUÇÕES:

- Verifique, nos espaços devidos do CARTÃO-RESPOSTA, se o número de controle é o mesmo que está ao lado do seu nome na folha de chamada. Caso o número de controle não corresponda ao que está nessa folha, comunique imediatamente ao fiscal de prova. Não se esqueça de assinar seu nome no primeiro retângulo.
- Marque as respostas das questões no CARTÃO-RASCUNHO, a fim de transcrevê-las, com caneta esferográfica preta, de ponta grossa, posteriormente, no CARTÃO-RESPOSTA.
- Não pergunte nada ao fiscal, pois todas as instruções estão na prova. Lembre-se de que uma leitura competente é requisito essencial para a realização da prova.
- Não rasure, não amasse nem dobre o CARTÃO-RESPOSTA, para que ele não seja rejeitado pela leitora.



As cinco primeiras questões são referentes à língua portuguesa.

Medicina Plugada

Fernanda Colavitti

1 Quando se fala em telemedicina, as primeiras imagens que nos vêm à cabeça são as de médicos-robôs,
2 cirurgia a distância e tudo que se relaciona à alta e complexa tecnologia. Apesar de essa ser a parte mais divulgada e
3 popular da telemedicina, são coisas muito mais simples e de baixo custo, como computadores e internet de banda larga,
4 que estão fazendo com que essa ferramenta transforme a maneira como a medicina vem sendo feita no mundo. Essas são as
5 grandes apostas dos especialistas para a ampliação dessa ferramenta, sobretudo no Brasil, onde os recursos são escassos.

6 As principais mudanças trazidas pela telemedicina no País estão no intercâmbio de informações científicas e
7 na chamada segunda opinião (na qual médicos localizados em comunidades distantes podem trocar impressões sobre
8 diagnósticos e tratamentos de pacientes com grandes centros nas capitais). “A telemedicina é uma técnica fundamental na
9 disseminação do conhecimento, ela é capaz de revolucionar as metodologias de ensino e aprendizagem”, diz a biomédica
10 Sandra Oyafuso, coordenadora do Centro de Informação e Comunicação da Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Albert
11 Einstein.

(Fonte: Galileu, janeiro 2006)

01

A expressão ‘telemedicina’ é um neologismo. De acordo com o texto, essa expressão designa procedimentos que

- (a) relegam a participação de médicos.
- (b) prescindem do paciente.
- (c) autorizam a automedicação.
- (d) coíbem médicos-robôs.
- (e) facultam a proximidade física entre médico e paciente.

02

No trecho sublinhado, encontramos alguns problemas de sentido decorrentes da má utilização de recursos do nível padrão de linguagem.

Assinale a alteração hipotética que adequar-la o trecho à modalidade padrão.

- (a) “distantes” por “distantes entre si”, pois há necessidade de referir-se a que se é distante.
- (b) “com os grandes centros” por “com os dos grandes centros”, pois assim se evita a ambigüidade da frase original.
- (c) “grandes centros nas capitais” por “centros populosos das capitais”, pois os recursos estão nas cidades mais importantes.
- (d) “sobre” por “a respeito de”, pois um texto escrito exige o nível formal de linguagem.

(e) “na qual” por “pelo qual”, pois o referente do relativo é o “intercâmbio”.

03

No texto, há expressões que substituem a palavra ‘telemedicina’ com o objetivo de evitar repetições. Dentre elas, está

- (a) coisas (linha 3).
- (b) dessa ferramenta (linha 5).
- (c) metodologias de ensino aprendizagem (linha 9).
- (d) medicina (linha 4).
- (e) grandes apostas (linha 5).

04

O pronome ‘nos’ (linha 1) refere-se a um elemento que está fora do texto. Esse elemento remete tanto ao autor do texto quanto a

- (a) médicos.
- (b) especialistas em telemedicina.
- (c) pesquisadores da área.
- (d) possíveis leitores.
- (e) pessoas dedicadas à telemedicina.

05

Quanto aos demais recursos lingüísticos utilizados ao longo do texto, analise as seguintes asserções.

- I) Ao trocarmos 'apesar de' (linha 2) por 'embora', teremos que fazer os seguintes ajustes no texto: "Embora essa seja a parte mais divulgada e popular da telemedicina [...]"
- II) A forma "vem sendo feita" (linha 4) pode ser substituída, sem prejuízo de sentido, por "virá a ser feita".
- III) A palavra "como" (linha 3) poderia ser corretamente substituída por "tais quais".
- IV) A substituição de "intercâmbio" (linha 6) por "fluxo" não implica perda de sentido da frase.

Estão corretas apenas

- (a) II e IV.
- (b) I e IV.
- (c) II e III.
- (d) I, II e IV.
- (e) I e III.

Conhecimentos específicos

06

Em relação ao processo de esterilização por autoclave, é correto afirmar que

- (a) o tempo de exposição do material ao vapor não depende de seu tipo.
- (b) os pacotes podem ser retirados da autoclave e utilizados imediatamente, sem esperar a completa secagem.
- (c) a autoclave é um aparelho cujo funcionamento ocorre pela combinação da ação do calor, pressão e umidade na destruição de microorganismos.
- (d) seu uso é limitado porque o calor seco não é tão penetrante quanto o calor úmido.
- (e) seu uso é indicado para materiais termosensíveis, como cateteres e materiais de terapia respiratória.

07

Coloque nos parênteses "V" quando a afirmativa for verdadeira e "F" quando for falsa

- I) () ao verificar o pulso de uma paciente, você está avaliando as possíveis alterações do fluxo sanguíneo, contando a quantidade de batimentos arteriais.
- II) () é correto afirmar que os movimentos de contração e relaxamento do coração são chamados, respectivamente, de diástole e sístole.
- III) () o pulso apical pode ser verificado colocando-se o diafragma do estetoscópio sobre o terço inferior do osso esterno.
- IV) () a quantidade de sangue bombeada a cada minuto pelo coração chama-se débito cardíaco.

De acordo com as respostas acima, assinale a alternativa correta:

- (a) Somente I, III e IV são verdadeiras.
- (b) Todas são verdadeiras.
- (c) Somente II e III são falsas.
- (d) Somente II e IV são verdadeiras.
- (e) Todas são falsas.

08

Quanto às medidas de higiene e conforto, coloque verdadeiro (V) ou falso (F) nas alternativas abaixo e, após assinale a alternativa que apresenta a seqüência correta.

- () A integridade da pele constitui defesa contra as infecções e as pressões dos tecidos subjacentes.
- () Para estabelecer os cuidados com a pele, é importante ter em mente a idade, pois as crianças são mais sensíveis.
- () Um dos aspectos importantes na prescrição do banho de leito é saber da necessidade diária do paciente, independentemente da faixa etária dele.
- () A higiene oral após as refeições ajuda a evitar o acúmulo de partículas alimentares sobre e entre os dentes, as quais, dependendo do estado do paciente, podem levar às infecções cruzadas.

- (a) V,V,F,V.
- (b) F,F,V,F.
- (c) V, F, F, V.
- (d) V,V,F,F.
- (e) V,F,V,V.

09

Em relação às precauções padrão deve-se

- (a) usar luvas de procedimento ou borracha, dispensando a lavagem das mãos.
- (b) lavar as mãos, com água e sabão, antes e após o contato com qualquer paciente ou material utilizado.
- (c) utilizar aventais ou capotes em quaisquer procedimentos de enfermagem.
- (d) evitar o reencape de agulhas, as quais devem ser desprezadas após o uso em um recipiente comum.
- (e) não usar máscara e óculos de proteção nos procedimentos durante os quais possam ocorrer respingos e gotas de sangue ou de fluídos.

10

Entre os dispositivos para administrar oxigênio, há o cateter nasal. É correto afirmar que, para instalá-lo,

- I) deve ser medido o comprimento em que será introduzido, calculando a partir da distância entre a ponta do nariz e o lóbulo da orelha.
- II) deve ser medido o comprimento em que será introduzido, calculando a partir da distância entre a ponta do nariz e o lóbulo da orelha. Esta medida deve ser dividida por dois.
- III) não é necessária uma medida exata; deve-se apenas introduzir 10 centímetros aproximadamente.

Está(ão) INCORRETA(S)

- (a) apenas I.
- (b) apenas I e II.
- (c) Apenas II.
- (d) I e III.
- (e) todas as afirmativas.

11

Quando respiramos, os músculos envolvidos nos movimentos de Inspiração são

- (a) diafragma e peitoral.
- (b) intercostais e trapézio.
- (c) diafragma e peitoral maior.
- (d) intercostais e diafragma.
- (e) intercostais e peitoral maior.

12

Existem três posições distintas utilizadas com frequência na prática de enfermagem: decúbito dorsal, decúbito lateral, e decúbito ventral, as quais podem ser definidas, respectivamente, da seguinte maneira:

- (a) quando o corpo está apoiado sobre o ventre; quando o antebraço se encontra com a palma da mão para cima; quando a palma da mão e do pé estão virados para baixo.
- (b) quando o corpo está apoiado sobre o ventre; quando o corpo está apoiado de um lado específico; quando o corpo se encontra com o dorso em contato com a superfície de apoio.
- (c) quando o corpo está apoiado de um lado específico; quando o corpo se encontra com o dorso em contato com a superfície de apoio; quando o corpo está apoiado sobre o ventre.
- (d) quando o antebraço se encontra com a palma da mão para cima; quando o corpo está apoiado sobre o ventre; quando o corpo se encontra de um lado específico.
- (e) quando o corpo se encontra com o dorso em contato com a superfície de apoio; quando o corpo está apoiado de um lado específico; quando o corpo está apoiado sobre o ventre.

13

Foi prescrito para o senhor N.C.F. 3.000.000 u de penicilina cristalina, sendo que a apresentação é de 5.000.000 u. **Quanto ml devem ser administrados a esse paciente?**

- (a) 8 ml.
- (b) 6 ml.
- (c) 0,6 ml.
- (d) 0,8 ml.
- (e) 10 ml.

14

Determinadas patologias ou cirurgias requerem algumas posições no leito para reduzir sintomas indesejáveis e/ou ajudar na recuperação dos clientes.

Escreva "V" para as proposições verdadeiras e "F" para as falsas:

- I) Posição de fowler – decúbito dorsal, cabeça elevada a 45 graus e membros inferiores elevados à altura do coração.
- II) Posição de trendelenburg – decúbito dorsal, elevando os pés do leito com calços próprios.
- III) Posição de simis – decúbito lateral direito ou esquerdo, sem pressionar o braço do paciente sob o corpo.
- IV) Posição de litotomia – necessária para exame cerebral do paciente.
- V) Posição ginecológica – necessária para exame e tratamento vaginal e retal.

De acordo com as afirmações acima, é correto afirmar que

- (a) somente II e V são verdadeiras.
- (b) somente II, III e V são verdadeiras.
- (c) somente I e V são verdadeiras.
- (d) I, II e III são verdadeiras.
- (e) todas as afirmativas são verdadeiras.

15

Em relação ao paciente em uso de cateterismo vesical de demora, analise as alternativas e assinale a INCORRETA.

- (a) Nos casos de transporte de paciente, deve-se pinçar o tubo coletor 10 minutos antes do transporte e abrir 10 minutos após o paciente estar no leito.
- (b) O coletor deve ser mantido abaixo do nível da bexiga, para evitar o refluxo e, conseqüentemente, a infecção urinária.
- (c) Deve-se fixar o coletor ao leito para possibilitar o fluxo contínuo da urina.
- (d) Ao fixar a sonda, deve-se ter cuidado de não tracioná-la.
- (e) Ao realizar a higiene íntima, deve-se preparar o ambiente, o paciente e o material de modo a propiciar conforto, segurança e privacidade.

16

A dieta enteral deve ser administrada por método intermitente. Analise as afirmações abaixo.

- I) A introdução da alimentação pode ser feita com uma seringa, sendo que a melhor forma de administração é o gotejamento por gravidade.
- II) A introdução da alimentação pode ser feita por bomba de infusão.
- III) O fluxo da administração da alimentação deve ser lento para evitar diarreia, náuseas e distensão abdominal.
- IV) O posicionamento da sonda e sua permeabilidade devem ser testados, antes de instalar a nutrição enteral.
- V) Tempo de 20 a 30 minutos deve ser observado rigorosamente para administração da alimentação.

Estão corretas

- (a) somente I, II e III.
- (b) somente IV e V.
- (c) somente I, II, IV e V.
- (d) somente II e IV.
- (e) todas as afirmações.

17

É correto afirmar que

- I) a troca de curativos não deve ser feita com soluções frias, porque podem baixar a temperatura da superfície em vários graus.
- II) um curativo encharcado favorece a proliferação de bactérias, devendo ser trocado imediatamente.
- III) um curativo de ferida limpa deve começar por uma limpeza de fora para dentro.
- IV) desbridamento é a retirada de tecido necrosado.
- V) um curativo objetiva acelerar o processo de cicatrização de fora para dentro, evitando contaminação de microorganismos.

A alternativa que contém as afirmações corretas é:

- (a) I, II e IV.
- (b) somente I e II.
- (c) II, IV e V.
- (d) somente I e IV.
- (e) I, II e V.

18

Hematêmese significa

- (a) sangramento vaginal.
- (b) sangue nas fezes.
- (c) perda de sangue no vômito.
- (d) perda de sangue na urina.
- (e) hemorragia pulmonar.

19

Ao administrar a medicação por via parenteral deve-se ter o cuidado de definir o ângulo de aplicação, conforme a agulha disponível (se a agulha é de 10x5, aplicar em ângulo de 90 graus; se for 25x7, aplicar em ângulo de 45 graus). **A afirmação acima refere-se a qual forma de administração parenteral?**

- (a) Intramuscular.
- (b) Intradérmica.
- (c) Endovenosa.
- (d) Subcutânea.
- (e) Subcutânea e intradérmica.

20

O volume mais adequado para aplicação de medicamentos via parenteral está relacionado com o músculo em que será aplicada a medicação. A partir dessa afirmação, numere a segunda coluna de acordo com a primeira.

1ª coluna	2ª coluna
1) Deltóide	() 4 ml
2) Glúteo	() 2 ml
3) Coxa	() 3 ml

Assinale a seqüência correta da segunda coluna.

- (a) 3, 1, 2.
- (b) 2, 3, 1.
- (c) 1, 3, 2.
- (d) 2, 1, 3.
- (e) Nenhuma das alternativas está correta.

21

Calcule o gotejamento de soro para correr 500ml de soro glicosado a 5% em 8 horas.

- (a) 21 microgotas por minuto.
- (b) 30 microgotas por minuto.
- (c) 21 gotas por minuto.
- (d) 30 gotas por minuto.
- (e) 20 gotas por minuto.

22

Por ser uma área desprovida de grandes vasos e nervos, é indicada para aplicação de medicamentos em pessoas de qualquer idade, principalmente em crianças. Localiza-se o local da injeção colocando-se o dedo indicador sobre a espinha ilíaca antero-posterior e a palma da mão sobre a cabeça do fêmur (trocanter). Em seguida, desliza-se o adjacente (médio) para formar um V. A injeção no centro do V alcança os músculos glúteos. **O músculo a que se refere a afirmativa é o**

- (a) Ventro-glúteo (Hochestetter).
- (b) Dorso-glúteo.
- (c) Deltóide.
- (d) Antero-lateral da coxa.
- (e) Região glútea.

23

Analise as afirmações.

- I) Antes e após a verificação da PA, deve-se realizar a desinfecção do diafragma e das olivas do estetoscópio.
- II) Para que a aferição da PA seja fidedigna, não se deve aferi-la em membros com FAV(Fístula artério-venosa) e cateteres venosos
- III) Deve-se palpar o pulso braquial e inflar o manguito até o pulso deixar de ser sentido.

Está(ão) correta(s)

- (a) somente I.
- (b) somente III.
- (c) somente I e II.
- (d) somente II e III.
- (e) todas as afirmativas.

24

São fatores de risco para o câncer de colo de útero:

- I) início da atividade sexual em idade precoce.
- II) menopausa precoce.
- III) menarca após os 11 anos.
- IV) baixo nível sócio-econômico.
- V) histórico de doenças sexualmente transmissíveis.

Estão corretas.

- (a) somente I, II e V.
- (b) somente I, IV e V.
- (c) somente II, III e V.
- (d) somente II, IV e V.
- (e) todas estão corretas.

25

Numere a segunda coluna de acordo com a primeira.

- 1) Placenta prévia
- 2) Prenhez ectópica
- 3) Descolamento prematuro de placenta
- 4) Polidrâmnia

- () é a quantidade excessiva de líquido amniótico.
- () é a separação precoce da placenta do corpo uterino.
- () é quando se dá a implantação do ovo fecundado nas trompas uterinas, ovários e outros.
- () caracteriza-se pela implantação da placenta na parte inferior do útero.

Assinale a seqüência correta da segunda coluna.

- (a) 3,4,2,1
- (b) 1,2,3,4
- (c) 4,3,2,1
- (d) 2,3,4,1
- (e) 4,2,1,3

26

Em relação às complicações das mamas sobre o período pós-parto, é correto afirmar que

- (a) o engurgitamento mamário ocorre em torno do terceiro ao sétimo dia pós parto. A conduta do auxiliar de enfermagem deve ser: orientar sobre a pegada correta da auréola, a posição adequada do recém nascido durante a mamada e a ordenha sempre que as mamas estiverem cheias.
- (b) o auxiliar de enfermagem deve orientar a mãe a diminuir a frequência das mamadas quando houver rachaduras ou fissuras.
- (c) a verificação da temperatura axilar nos casos de mastite é indicada.
- (d) a amamentação deve ser suspensa quando houver dor, hiperemia e calor localizado.
- (e) As alternativas a, b, c, e d estão corretas.

27

A fototerapia consiste na aplicação de uma luz sobre a pele exposta do RN. Sobre esse tema, assinale a alternativa INCORRETA.

- (a) Manter o aparelho em local ventilado, evitando o superaquecimento.
- (b) Não usar óleo hidratante sobre a pele do RN.
- (c) Deve-se verificar a temperatura do RN a cada 4 horas.
- (d) Ao posicionar o RN sob o aparelho, deve se mudar o decúbito a cada 6 horas.
- (e) A fim de prevenir lesão de retina, deve-se colocar sobre os olhos do RN uma proteção de cor escura.

28

Os cuidados ao RN são aqueles prestados pelo auxiliar de enfermagem, que deve preparar o ambiente e o material necessário. **De acordo com a afirmação anterior marque a alternativa correta.**

- (a) Aferição dos sinais vitais e das medidas antropométricas, higienização corporal, realização de curativo do coto umbilical e administração da vitamina K são necessárias.
- (b) Aferição dos sinais vitais, higienização corporal, realização de curativo do coto umbilical são importantes.
- (c) A primeira higiene visa retirar o excesso de sangue e outras sujidades, sendo necessário retirar todo o vernix caseoso.
- (d) O curativo do coto umbilical deve ser feito com álcool a 70% três vezes ao dia.
- (e) Todas as alternativas estão corretas .

29

Sobre desidratação infantil, é correto afirmar que

- I) olhos encovados, fontanela deprimida, saliva espessa ou ausente, são sinais de desidratação.
- II) ausência de lágrimas ou brilho no olhar, turgor diminuído, língua seca, não são sinais de desidratação.
- III) anúria, letargia, pulso fino e rápido são sinais de agravamento da desidratação.
- IV) são sinais de desidratação grave: pulso débil, olhos muito fundos, ausência de lágrimas, boca e língua muito secas.

Quanto às afirmativas,

- (a) somente I, II e III estão corretas.
- (b) somente I, III e IV estão corretas.
- (c) somente I, II e IV estão corretas.
- (d) todas estão corretas.
- (e) todas estão erradas.

30

São sinais de sofrimento fetal.

- I) frequência cardíaca em bradicardia.
- II) coloração esverdeada e ou achocolatada do líquido amniótico.
- III) batimentos cardíacos fetais abaixo de 120 bpm.
- IV) movimentos fetais inicialmente aumentados e posteriormente diminuídos.

Está(ão) correta(s)

- (a) somente I.
- (b) somente I e IV.
- (c) somente I, III e IV.
- (d) todas as afirmativas.
- (e) nenhuma das afirmativas.

31

São sinais indicativos de sofrimento respiratório na criança:

- I) aumento de frequência respiratória;
- II) presença de tiragens subcostais e intercostais;

- III) palidez cutânea e mucosas acentuadas;
- IV) gemidos, letargia e estridor;

Estão corretas

- (a) somente I e II.
- (b) somente I, II e III.
- (c) somente I, II e IV.
- (d) somente I e IV.
- (e) todas as alternativas.

32

O esvaziamento intestinal no pré-operatório tem o objetivo de

- (a) liberar flatos durante a cirurgia.
- (b) diminuir o risco de liberação do conteúdo intestinal durante a cirurgia.
- (c) prevenir infecção no pós-operatório.
- (d) aumentar a liberação de flatos no intra-operatório.
- (e) todas as alternativas estão incorretas.

33

Assinale "V" para as afirmativas verdadeiras e "F" para as falsas:

- () dispnéia e tosse produzindo escarro espumoso são sinais de sintomas de edema agudo de pulmão.
- () a posição correta para colocar um paciente com edema agudo de pulmão é sentá-lo em semi-fowler, com as pernas para baixo.
- () a principal característica do edema agudo de pulmão é a dor torácica.
- () é necessário a manutenção de via venosa pérvia com gotejamento mínimo para evitar a sobre carga volêmica.

Assinale a seqüência correta.

- (a) V, F, F, V
- (b) F, F, V, V
- (c) V, F, F, F
- (d) F, F, F, V
- (e) V, V, V, F

No transcorrer da cirurgia, alguns cuidados se fazem necessários. É **INCORRETO** afirmar que

- (a) o posicionamento inadequado da placa de bisturi no ato cirúrgico pode provocar queimaduras no cliente.
- (b) a perda de sangue, de líquidos pelas sondas e do sangue aspirado no frasco do aspirador deve ser avaliada.
- (c) não é necessário controlar a quantidade e peso das compressas cirúrgicas e gazes.
- (d) todas as alternativas estão corretas.
- (e) todas as alternativas estão incorretas.

As velas mais adequadas para serem punccionadas em crianças na idade pré-escolar são as do

- (a) pé – braço – antebraço.
- (b) braço – antebraço – couro cabeludo.
- (c) braço – ante-braço – dorso das mãos.
- (d) braço – antebraço – pescoço.
- (e) pé – couro cabeludo.

Chega à emergência um paciente que sofreu traumatismo craniano, após ter sido atropelado, encontra-se em PCR (parada cardíaco-respiratória). O auxiliar de enfermagem na unidade **NÃO** deve ter a seguinte conduta:

- (a) desobstrução das vias aéreas, hiperextensão do pescoço, punção do acesso venoso.
- (b) desobstrução das vias aéreas, tração da mandíbula para frente, ventilação, massagem cardíaca.
- (c) desobstrução das vias aéreas, mediante a retirada de próteses, corpo estranho e secreções.
- (d) desobstrução das vias aéreas com controle de cervical, ventilação e massagem cardíaca.
- (e) Rapidez e eficácia nas manobras de ressuscitação cardíaco-pulmonares porque, após 4 minutos da interrupção da circulação cerebral, inicia-se o processo de lesão irreversível do cérebro.

Marque a alternativa correta em relação aos aspectos ético-legais que devem ser considerados e observados pela equipe de saúde que atua no pronto socorro:

- I) o consentimento ao tratamento é assinado pelo próprio paciente, quando consciente, e por seus familiares e ou parentes próximos nos casos em que esteja inconsciente, confuso, com problemas psiquiátricos, ou seja menor de idade.
- II) no caso de iminente perigo de morte, ao paciente que não consegue dar o seu consentimento e cuja família não se encontra presente, as normas de ética permitem que os profissionais de saúde prestem o atendimento de emergência.
- III) todo paciente deve ser chamado pelo nome, inclusive os inconscientes.
- IV) toda equipe de emergência deve estar preparada para ouvir por parte do cliente e família, queixas de remorso e culpa, bem como expressão de raiva e ou lamentações.

- (a) Somente I, II e III estão corretas.
- (b) Somente I e III estão corretas.
- (c) A afirmação IV está incorreta.
- (d) As afirmações I e IV estão incorretas.
- (e) Todas as afirmações estão corretas.

No caso de retenção urinária, quais são as medidas possíveis para estimular a diurese espontânea?

- (a) Abrir torneiras e chuveiros próximos do paciente, realizar cateterismo vesical de demora.
- (b) Molhar os pés dos pacientes acamados, realizar cateterismo vesical de demora.
- (c) Garantir a privacidade durante a micção, molhar os pés dos clientes acamados, pois essa medida ajuda a relaxar os esfíncteres uretrais.
- (d) Garantir a privacidade durante a micção, colocar bolsa com água fria na região suprapúbica.
- (e) Todas as alternativas são verdadeiras.

Não é fator de risco para pneumonia:

- (a) desnutrição.
- (b) febre alta.
- (c) tabagismo.
- (d) imobilidade no leito.
- (e) indivíduos imunodeprimidos.

40

Em relação à aspiração de secreções das vias aéreas é **INCORRETO** afirmar que

- (a) as sondas de aspiração devem ser utilizadas uma única vez, desprezando-a ao término do procedimento.
- (b) a aspiração nunca deve exceder o período de 15 segundos.
- (c) a aspiração através das narinas, devido a aspectos anatômicos, facilita o acesso à traquéia.
- (d) a aspiração deve obedecer à seqüência oral – nasal.
- (e) a aspiração deve ser realizada de 1 em 1 hora.

41

Analise as afirmações abaixo.

- I) Ao administrar insulina, deve se evitar o massageamento do local da aplicação.
- II) Uma pessoa com hipoglicemia pode apresentar sudorese intensa, palidez, palpitações, fome e visão embaçada.
- III) Poliúria, sede intensa, desidratação, rubor facial, sonolência são sinais de cetoacidose diabética.
- IV) O infarto agudo do miocárdio, acidente vascular cerebral e a doença vascular periférica são complicações crônicas do diabetes.

Estão corretas as afirmativas

- (a) I, II e III apenas.
- (b) I, II e IV apenas.
- (c) I, II, III e IV.
- (d) I, III e IV apenas.
- (e) I e IV apenas.

42

São sinais de hemorragia no pós-operatório imediato:

- (a) sensação de desconforto, palidez intensa, mucosa descorada, bradicardia e dispnéia.
- (b) sensação de desconforto, palidez intensa, mucosa descorada, bradicardia, dispnéia e hipertermia.
- (c) somente **a** e **b** estão corretas.
- (d) sensação de desconforto, palidez intensa, mucosa descorada, taquicardia e dispnéia.
- (e) todas estão corretas.

43

A assistência de enfermagem prestada ao paciente em coma consiste em

- I) manter as vias aéreas desobstruídas.
- II) conservar os olhos umedificados e protegidos, como prevenção de escara de córnea.
- III) estimular movimentos ativos no leito na prevenção da formação de trombos.
- IV) umidificar a mucosa oral, evitando fissuras e outras lesões.

Estão corretas apenas as afirmativas

- (a) I, II e IV.
- (b) I, II e III.
- (c) II e III.
- (d) III e IV.
- (e) I, III e IV.

44

No que se refere à contenção mecânica a um paciente portador de transtorno mental, é **INCORRETA** a seguinte prescrição.

- (a) para evitar fraturas, procura-se colocar o paciente no chão o mais depressa possível.
- (b) colocar ataduras almofadadas nos punhos e tornozelos.
- (c) realizar a contenção mecânica com o corpo do profissional de saúde.
- (d) conter o paciente, apertando-lhe o pescoço e o tórax.
- (e) empregar técnicas com firmeza e rapidez.

45

São doenças oportunistas que podem se manifestar no paciente portador do vírus HIV:

- (a) tuberculose, sarcoma de kaposi, hipertensão arterial.
- (b) diarreia, toxoplasmose, sarcoma de kaposi.
- (c) diarreia, sarcoma de kaposi, miocardite.
- (d) diarreia, doença reumática, tuberculose.
- (e) toxoplasmose, sarcoma de kaposi, gota.