



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS - CES
Concurso Público (Aplicação: 02/04/2006)
Cargo: ENFERMEIRO/NS

LEIA ATENTAMENTE AS SEGUINTE INSTRUÇÕES:

- Verifique, nos espaços devidos do CARTÃO-RESPOSTA, se o número de controle é o mesmo que está ao lado do seu nome na folha de chamada. Caso o número de controle não corresponda ao que está nessa folha, comunique imediatamente ao fiscal de prova. Não se esqueça de assinar seu nome no primeiro retângulo.
- Marque as respostas das questões no CARTÃO-RASCUNHO, a fim de transcrevê-las, com caneta esferográfica preta, de ponta grossa, posteriormente, no CARTÃO-RESPOSTA.
- Não pergunte nada ao fiscal, pois todas as instruções estão na prova. Lembre-se de que uma leitura competente é requisito essencial para a realização da prova.
- Não rasure, não amasse nem dobre o CARTÃO-RESPOSTA, para que ele não seja rejeitado pela leitora.



As cinco primeiras questões são referentes à língua portuguesa.

Pesquisando sobre o medicamento Feldene para apresentação de um trabalho, um internauta encontrou um texto do qual foi extraído o seguinte trecho:

“Uso durante a Gravidez e Lactação

1 Apesar de não terem sido observados efeitos teratogênicos em testes com animais, o uso de Feldene®
2 durante a gravidez não é recomendado. O piroxicam inibe a síntese e liberação das prostaglandinas através de uma inibição
3 reversível da enzima ciclooxigenase. Este efeito, assim como ocorre com outros AINEs, **ASSOCIAR** a uma incidência maior
4 de distocia e parto retardado em animais quando o fármaco é administrado até o final da gravidez. AINEs também podem
5 induzir ao fechamento do ducto arterioso em crianças.

6 A presença de piroxicam no leite materno foi verificada durante o tratamento inicial e o de longa duração (52
7 dias). A concentração de piroxicam no leite materno é aproximadamente 1% a 3% a do plasma. Durante o tratamento, não
8 houve acúmulo de piroxicam no leite em comparação ao plasma. Feldene® não é recomendado durante a lactação, pois a
9 segurança de seu uso em lactantes ainda não foi estabelecida.”

01

Caso o internauta quisesse reescrever a primeira frase do excerto, a única alteração NÃO condizente com o original seria:

- (a) Embora não tenham sido observados efeitos teratogênicos em testes com animais, o uso de Feldene® durante a gravidez não é recomendado.
- (b) Ainda que não observados efeitos teratogênicos em testes com animais, o uso de Feldene® durante a gravidez não é recomendado.
- (c) Mesmo não tendo sido observados efeitos teratogênicos em testes com animais, o uso de Feldene® durante a gravidez não é recomendado.
- (d) Não obstante inobservados efeitos teratogênicos em testes com animais, o uso de Feldene® durante a gravidez não é recomendado.
- (e) Em virtude de não terem sido observados efeitos teratogênicos em testes com animais, o uso de Feldene® durante a gravidez não é recomendado.

02

Segundo o site, a associação relatada na linha 3 é recente. Para expressar esse sentido pretendido, a palavra “associar” (destacada em negrito e maiúsculas no texto) deveria ser substituída por

- (a) havia sido associado.
- (b) associara-se.
- (c) teria sido associado.
- (d) viria sendo associado.
- (e) tem sido associado.

03

Analise as alterações propostas pelos itens a seguir.

- I) “observados” por “constatados” (linha 1)
- II) “inibe” por “acarreta” (linha 2)
- III) “também” por “igualmente” (linha 4)
- IV) “aproximadamente” por “ocasionalmente” (linha 7)

Estão corretas apenas as alterações propostas pelos itens

- (a) II e III.
- (b) II, III e IV.
- (c) I e III.
- (d) I e II.
- (e) II e IV.

04

Na redação do texto, percebemos a presença de algumas preposições. **Assinale a substituição que preservaria o sentido original, mas NÃO exigiria ajustes no restante da frase.**

- (a) “com” por “em” (linha 1)
- (b) “durante” por “enquanto” (linha 2)
- (c) “durante” por “após” (linha 6)
- (d) “através” por “mediante” (linha 2)
- (e) “até” por “ao” (linha 4)

05

Muitas vezes ao substituímos o número de uma palavra (singular para o plural, por exemplo), convém termos atenção a todas as alterações que devemos fazer ao longo da frase.

Analise as substituições propostas e a quantidade de alterações de número necessariamente implicadas, desconsiderando, para efeito de contagem, a permuta sugerida.

- I) “efeitos” por “efeito” (linha 1) - 3
- II) “teste” por “testes” (linha 1) - 0
- III) “AINEs” por “AINE” (linha 3) - 2
- IV) “inibição” por “inibições” (linha 2) - 3

Assinale a alternativa que contém os itens corretos.

- (a) II e III.
- (b) III e IV.
- (c) I e IV.
- (d) I e III.
- (e) I e II.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

06

Sobre HIV, analise as afirmativas abaixo:

- I) Mulheres portadoras de HIV e com AIDS não têm o direito de engravidar, para evitar proliferação da doença.
- II) A transmissão vertical da AIDS independe das condições da infecção materna.
- III) A transmissão vertical pode ocorrer intra-útero, no parto e pós-parto.
- IV) A transmissão do HIV de mulheres infectadas para seus filhos é a principal forma de disseminação deste vírus na população pediátrica em todo o mundo.

Com base na análise, está(ão) correta(s).

- (a) somente III e IV.
- (b) somente I.
- (c) somente II e IV.

- (d) somente I, II e III.
- (e) todas as afirmativas.

07

Analise as afirmativas abaixo relativas às responsabilidades profissionais do enfermeiro, constantes do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem.

- I) Assegurar ao paciente uma assistência de enfermagem livre de danos decorrentes de imperícia, negligência ou imprudência.
- II) Promover e/ou facilitar o aperfeiçoamento técnico, científico e cultural do pessoal sob sua orientação e supervisão.
- III) Colaborar com a equipe de saúde no esclarecimento ao paciente e aos familiares sobre o seu estado de saúde e tratamento, possíveis benefícios, riscos e conseqüências que possam ocorrer.
- IV) Avaliar criteriosamente sua competência técnica e legal e somente aceitar encargos ou atribuições quando capaz de desempenho seguro para si e para a clientela.

Com base na análise, está(ão) correta(s)

- (a) somente I.
- (b) somente II e IV.
- (c) somente III e IV.
- (d) somente I, II e III.
- (e) todas as afirmativas.

08

Dentre as ações de enfermagem que podem evitar a elevação da Pressão Intra Craniana (PIC) ou mesmo reduzi-la, destaca(m)-se:

- (a) freqüente mudança de decúbito, com elevação do leito.
- (b) aspiração freqüente com hiperventilação.
- (c) irrigação da linha da PIC de 1/1 hora e elevação do leito a 90°.
- (d) eliminação de causas extracranianas da PIC.
- (e) passagem de uma sonda nasogástrica.

Considerando a importância do preparo pré-operatório para uma cirurgia, analise as afirmativas abaixo:

- I) Os pacientes com mais de 50 anos, ao serem submetidos a cirurgias torácicas ou abdominais, devem ser orientados quanto à necessidade do uso de heparina para a prevenção de trombose venosa.
- II) O preparo psicológico durante o período pré-operatório diminui a incidência de vômitos pós-operatórios.
- III) III – O período de tempo entre a tricotomia pré-operatória e o ato cirúrgico tem um efeito direto sobre a taxa de infecção da ferida cirúrgica.
- IV) IV – As orientações pré-operatórias ao paciente devem ser dadas respeitando as suas individualidades e diferenças, buscando assim, a humanização do cuidado.

Com base na análise, está(ão) correta(s).

- (a) somente I.
- (b) somente II e IV.
- (c) somente III e IV.
- (d) somente I, II e III.
- (e) todas as afirmativas.

A fim de promover uma função respiratória adequada em um paciente inconsciente no pós-operatório imediato que recentemente foi admitido na SRPA (sala de recuperação pós-anestésica) e que não tem contra-indicação quanto à mobilização e à prescrição de enfermagem, deve-se

- (a) posicionar o paciente em decúbito dorsal e com a cabeça elevada por travesseiros.
- (b) mudar o decúbito a cada 10 minutos, de um lado para o outro.
- (c) posicionar o paciente lateralmente com um travesseiro nas costas e com o queixo estendido.
- (d) posicionar o paciente em supinação e realizar a manobra de extensão da mandíbula.
- (e) posicionar o paciente em pronação para facilitar a drenagem das secreções.

São características do comportamento depressivo:

- (a) fuga de idéias, ilusão e ansiedade.
- (b) negativismo, apatia, mutismo e lentidão do pensamento
- (c) ilusão, instabilidade do humor e fuga de idéias.
- (d) ambivalência, agitação psicomotora e apatia.
- (e) lentidão do pensamento, angústia e logorréia.

Numere a 2ª coluna de acordo com a 1ª.

1ª coluna

- 1. Acidose respiratória
- 2. Alcalose respiratória
- 3. Acidose metabólica
- 4. Alcalose metabólica

2ª coluna

- () Tem como uma das causas intoxicação exógena
- () Tem como uma das causas perda de secreção gástrica
- () Tem como uma das causas o edema pulmonar grave
- () Tem como causa a hiperventilação mecânica

Assinale a alternativa que apresenta a ordem correta para a 2ª coluna.

- (a) 3, 4, 1, 2
- (b) 3, 4, 2, 1
- (c) 4, 3, 1, 2
- (d) 4, 3, 2, 1
- (e) 1, 3, 4, 2

A distribuição diária do serviço da equipe de enfermagem, em que cada funcionário é designado para executar procedimentos específicos, é uma forma de cuidado baseada no método

- (a) integral.
- (b) intermediário.
- (c) intensivo.
- (d) funcional.
- (e) total.

14

A criança A. S. C de sete meses foi levada ao pronto-socorro porque apresentou vários episódios de evacuação líquida. Ela foi submetida ao exame físico, a partir do qual se concluiu que ela está com desidratação de 2º grau ou moderada. **Tendo em vista a situação-problema apresentada, os sinais correspondentes ao diagnóstico feito acerca da criança em questão, são**

- (a) fontanela muito deprimida, ausência de diurese, pele fria e irritação.
- (b) pele fria, ausência de lágrimas, fontanela deprimida e turgor de pele diminuindo.
- (c) diurese diminuída, olhos fundos, fontanela deprimida e turgor de pele diminuído.
- (d) irritação, fontanela muito deprimida, olhos fundos e ausência de diurese.
- (e) diurese diminuída, poucas lágrimas, olhos fundos e boca seca.

15

Relacione a 2ª coluna de acordo com a 1ª.

- 1. É o determinado por agente estranho ou choque térmico na corrente sangüínea. () Choque cardiogênico.
- 2. É o choque séptico ou choque anafilático. () Choque distributivo.
- 3. É o tamponamento cardíaco. () Choque obstrutivo.
- 4. É o fluxo sangüíneo inadequado, em razão de falha primária na função cardíaca. () Choque pirogênico.

Assinale a alternativa que apresenta a seqüência correta para a 2ª coluna.

- (a) 3; 1; 2; 4.
- (b) 4; 2; 3; 1.
- (c) 1; 4; 2; 3.
- (d) 3; 1; 4; 2.
- (e) 2; 3; 1; 4.

16

A habilidade de exercer influência interpessoal por meio da comunicação para consecução de um ou mais objetivos específicos é própria da:

- (a) chefia.
- (b) gerência.
- (c) administração.
- (d) liderança.
- (e) supervisão.

17

A estrutura conceitual da Teoria da Imogene King para assistência de enfermagem é composta dos seguintes Sistemas Interativos:

- (a) Pessoais, Interpessoais e Sociais.
- (b) Interpessoais, Terapêuticos e Sociais.
- (c) de Conservação, Pessoais e Homeodinâmicos.
- (d) Sociais, Hemodinâmicos e Perceptivos.
- (e) Interpessoais, de Conservação e Terapêuticos.

18

Competem ao enfermeiro supervisor, além de outras atribuições,

- I) discutir convicções, valores e objetivos do serviço de enfermagem.
- II) planejar e desenvolver ações de enfermagem segundo critérios e prioridades definidas.
- III) prever e prover recursos humanos, materiais, físicos e orçamentários necessários ao desenvolvimento das atividades de enfermagem.
- IV) planejar, executar e avaliar programas de desenvolvimento de pessoal.

Estão corretas as afirmativas

- (a) apenas I e II.
- (b) I, II, III e IV.
- (c) apenas III e IV.
- (d) apenas II e IV.
- (e) apenas I e III.

Marque V ou F no que se refere à diálise peritoneal e, após, assinale a alternativa com seqüência correta.

- () Obesidade mórbida é uma contra indicação relativa para diálise peritoneal.
- () Diálise peritoneal aguda está indicada a um paciente com distúrbio hidroeletrólítico, porém é contra-indicada a um paciente com acidose metabólica grave.
- () Líquido turvo, dor abdominal e disfunção gastrointestinal são sinais específicos de peritonite, sendo que o agente etiológico mais comum é o *Staphylococcus aureus*.
- () A desidratação é uma complicação da diálise peritoneal, e uma das ações preventivas é equilibrar ingesta e perda de líquidos.
- () A dor persistente na infusão do líquido dialítico não é uma situação que indique a retirada do cateter peritoneal.

- (a) V, V, F, V, V
 (b) V, V, V, F, F
 (c) V, V, V, V, F
 (d) V, F, V, V, F
 (e) V, V, V, V, V.

A doença isoimune devido à incompatibilidade Rh ocorre quando os antígenos Rh entram na circulação de uma mãe. Logo, a mãe apresenta Rh

- (a) negativo que produz anticorpos anti Rh que atravessam a placenta, provocando hemólise no feto com Rh positivo.
- (b) positivo e produz anticorpos anti Rh que atravessam a placenta, provocando hemólise no feto com Rh negativo.
- (c) negativo e produz anticorpos anti Rh que atravessam a placenta, provocando hemólise no feto com Rh negativo.
- (d) positivo e produz anticorpos anti Rh que atravessam a placenta, provocando hemólise no feto com Rh positivo.
- (e) positivo e produz anticorpos anti Rh que atravessam a placenta, provocando hemólise no feto com Rh negativo, quando o pai é Rh negativo.

Relacione a 2ª coluna de acordo com a 1ª coluna.

1ª Coluna

1. Placenta prévia total
2. Placenta prévia marginal
3. Placenta prévia parcial
4. Placenta prévia lateral

2ª Coluna

- () A borda da placenta atinge o orifício interno da cérvix
- () A placenta fecha completamente o colo
- () O colo é preenchido incompletamente
- () Ela não atinge o orifício interno da cérvix

- (a) 2, 1, 4, 3.
 (b) 2, 1, 3, 4.
 (c) 3, 4, 2, 1.
 (d) 2, 4, 3, 1.
 (e) 4, 1, 3, 2.

As afirmações a seguir referem-se à parada cardiorrespiratória. Assinale a alternativa incorreta.

- (a) A ausência de pulso carotídeo ou femoral e a contração das pupilas são sintomas de parada cardiorrespiratória.
- (b) O principal sintoma da parada cardiorrespiratória é a perda imediata da consciência.
- (c) A reanimação cardiopulmonar (RCP) básica consiste na seguinte seqüência: via aérea, respiração e circulação.
- (d) Na primeira etapa da RCP, a equipe deve abrir uma via aérea e ventilar o paciente, em média, 12 vezes por minuto.
- (e) Na segunda etapa da RCP, a compressão cardíaca externa é realizada, viabilizando uma circulação artificial.

Correlacione os distúrbios cardíacos da primeira coluna com os conceitos e características descritos na segunda coluna.

1ª coluna

1. Aterosclerose coronariana
2. Infarto do miocárdio
3. Insuficiência cardíaca
4. Arritmia
5. Miocardite
6. Pericardite

2ª coluna

- () Caracteriza-se pela incapacidade do coração em bombear uma quantidade suficiente de sangue para satisfazer as necessidades de oxigênio e nutrientes dos tecidos.
- () É um distúrbio clínico do batimento cardíaco que pode incluir uma perturbação na frequência, no ritmo ou em ambos.
- () É a inflamação do saco membranoso que envolve o coração.
- () Caracteriza-se por acúmulo anormal de substâncias lipídicas e tecido fibroso na parede do vaso.
- () É o processo inflamatório que compromete o músculo cardíaco.
- () É o processo pelo qual o tecido cardíaco é destruído, devido a um fluxo coronário reduzido.

A seqüência correta da numeração, na segunda coluna, de cima para baixo, é

- (a) 2 – 3 – 5 – 6 – 1 – 4
- (b) 2 – 3 – 4 – 1 – 6 – 5
- (c) 3 – 4 – 6 – 1 – 5 – 2
- (d) 3 – 4 – 5 – 1 – 6 – 2
- (e) 1 – 4 – 5 – 3 – 6 – 2

A região ventroglútea é considerada um dos locais básicos para administração de medicamento via intramuscular. Avalie as seguintes afirmações sobre essa região, assinalando com (V) as verdadeiras e com (F) as falsas.

- () O local para injeção é assinalado do lado direito do paciente, colocando-se a mão esquerda com a palma sobre a cabeça do trocânter do fêmur, o dedo indicador sobre a espinha ilíaca superior anterior, e o segundo dedo traça uma curva em "V" da crista ilíaca. O local para administração localiza-se dentro do "V" formado pelos dois dedos.
- () O local para injeção é assinalado do lado direito do paciente, colocando-se a mão direita com a palma sobre a cabeça do trocânter do fêmur, o dedo indicador sobre a espinha ilíaca superior anterior, e o segundo dedo traça uma curva em "V" da crista ilíaca. O local para administração localiza-se dentro de "V" formado pelos dois dedos.
- () É considerada uma região excelente para injeções intramuscular, devido à ausência de grandes vasos e nervos.
- () O paciente que recebe uma injeção neste local deve ficar em decúbito ventral ou lateral.
- () O paciente que recebe uma injeção neste local deve ficar em decúbito dorsal ou lateral.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é

- (a) V-F-F-F-V
- (b) V- F-F-V- F
- (c) V-F-V-F-V
- (d) F-V-F-V-F
- (e) F-V-V-F-V

No tratamento para Raiva humana, em uma pessoa agredida por um cão, com uma mordedura única e superficial em tronco e membros, deve-se considerar todas as medidas abaixo relacionadas, exceto

- (a) a inclusão da prevenção do tétano, entre os cuidados com os ferimentos.
- (b) a observação do animal, se ele estiver sadio; no décimo dia após a agressão, encerrar o caso.
- (c) a assepsia do ferimento, que deve ser feita com água e sabão, com curativo compressivo.
- (d) a aplicação de tratamento vacinal no paciente, se o animal se tornar raivoso, morrer ou desaparecer, durante o período de observação.
- (e) a aplicação do tratamento vacinal, que consiste em uma dose diária de vacina até completar 07 e 02 doses de reforço, uma no décimo e outra no vigésimo dia após a última série.

Um dos objetivos primários da triagem é priorizar a necessidade de emergência. Para tanto o enfermeiro deve conseguir classificar situações de emergência, urgência e não urgência. Analise as situações que caracterizam urgência e emergência e marque a alternativa correta.

- I) Sangramento vaginal importante é uma situação de emergência, pois o paciente tem risco de infecção.
- II) A dor abdominal aguda é uma situação de emergência, pois, embora o paciente não esteja em situação de urgência, corre riscos se não for atendido imediatamente.
- III) A tentativa de suicídio é uma situação de emergência, pois o paciente corre risco de vida.
- IV) A Insuficiência Cardíaca Congestiva (ICC) é uma situação de urgência, pois pode progredir para um Edema Agudo de Pulmão. (EAP).

Está(ão) correta(s) apenas

- (a) a situação III.
- (b) a situação II.
- (c) a situação I.
- (d) as situações I, II e IV
- (e) as situações II, III e IV.

O paciente com suspeita de litíase renal deve ser avaliado cuidadosamente, pois ela pode oferecer risco de dano renal. **Entre os sinais e sintomas mais frequentes para sugerir presença de litíase, é correto afirmar que estão**

- (a) história familiar, dieta rica em cálcio, disúria.
- (b) hematúria, febre, oligúria.
- (c) desidratação, história familiar, disúria.
- (d) hematúria, oligúria e dor em flancos
- (e) oligúria, imobilização prolongada.

São causas da Insuficiência Renal Crônica, EXCETO

- (a) diabetes Mellito.
- (b) rins policísticos.
- (c) pneumonias.
- (d) malformações congênitas.
- (e) Todas as alternativas.

Em relação à lei do Exercício Profissional da Enfermagem, de acordo com o Artigo 8º, além das atividades privativas ao enfermeiro, como integrante da equipe de saúde, cabe a ele

- I) realizar prescrição da assistência de enfermagem.
- II) participar na prevenção e controle das doenças transmissíveis em geral e nos programas de vigilância epidemiológica.
- III) prestar cuidados diretos de enfermagem a pacientes graves e com risco de perder a vida.

Assinale a alternativa correta.

- (a) Apenas a afirmativa I é verdadeira.
- (b) Apenas a afirmativa II é verdadeira.
- (c) Apenas a afirmativa III é verdadeira.
- (d) Apenas as afirmativas I e III são verdadeiras.
- (e) Todas as afirmativas são verdadeiras.

A taquicardia ventricular é caracterizada por contrações ventriculares prematuras, consecutivas e múltiplas. É muito perigosa, pois gera uma redução no débito cardíaco. A terapêutica utilizada, se o paciente estiver tolerando razoavelmente bem esta arritmia, é a administração de _____. Se o paciente estiver tolerando mal a taquicardia ventricular ou se a primeira medida terapêutica não converteu a arritmia, recorre-se _____. A taquicardia ventricular representa um precursor _____, em que não existe nenhum débito cardíaco.

Assinale a alternativa que completa correta e respectivamente as lacunas do texto acima.

- (a) propranolol- à lidocaína – da parada cardíaca
- (b) verapamil – à cardioversão – do bloqueio atrioventricular
- (c) lidocaína – ao propranolol – da parada cardíaca
- (d) lidocaína – à digoxina – da fibrilação ventricular.
- (e) lidocaína – à cardioversão – da fibrilação ventricular

31

A avaliação primária do traumatizado segue uma ordem de prioridades, sendo que a esses processos são chamados de ABCDE do atendimento ao traumatizado, estabelecendo condutas para o restabelecimento das condições vitais e para o tratamento de anormalidades. **Assim, o A significa**

- (a) circulação com controle de hemorragia.
- (b) exposição do paciente, protegendo-o contra a hipotermia.
- (c) avaliação da incapacidade e exame neurológico.
- (d) desobstrução de vias aéreas e controle de coluna cervical.
- (e) respiração e ventilação.

32

Ao avaliar um paciente com trauma cranioencefálico, verifica-se que ele apresenta Rigidez de descerebração, que significa

- (a) flexão com adução de membros superiores, extensão com rotação interna de membros inferiores e flexão plantar.
- (b) extensão e rotação externa dos membros superiores e flexão plantar dos pés.
- (c) flexão com adução de membros superiores, flexão com rotação externa de membros inferiores e flexão plantar.
- (d) extensão e adução dos membros superiores e flexão plantar de membros inferiores.
- (e) extensão com adução de membros superiores, flexão com rotação externa de membros inferiores e flexão plantar.

33

No período pós-operatório, é cuidado de enfermagem

- (a) mudar a posição do paciente rapidamente, na cama ou transferência.
- (b) posicionar o paciente em posição de fowler modificada, em cirurgia de varizes.
- (c) estar atento aos sinais de hipovolemia, que são aumento da pressão arterial, bradicardia e aumento de diurese.
- (d) verificar os sinais vitais, de 15 em 15 minutos, na primeira hora.
- (e) estar atento aos sinais de choque, que são pulso grosso e bradicárdico

34

O “processo de enfermagem é uma abordagem de solução de problemas para satisfazer as necessidades de enfermagem e de cuidado de saúde de uma pessoa”. (Brunner & Suddarth)

Baseado na afirmação acima, numere a 2ª coluna de acordo com a 1ª, escolhendo a alternativa que apresenta a numeração correta.

1ª coluna

1. Histórico de enfermagem
2. Diagnóstico de enfermagem
3. Planejamento de enfermagem
4. Implementação
5. Avaliação

2ª coluna

- () Registrar as reações do paciente às ações de enfermagem.
- () Organizar, analisar, sintetizar e resumir os dados colhidos.
- () Identificar as características definidoras dos problemas de enfermagem.
- () Continuar todas as etapas do processo de enfermagem.
- () Desenvolver por escrito o plano de cuidado de enfermagem.

(a) 2, 1, 5, 3,4

(b) 3, 5, 1, 2, 4

(c) 4, 1, 3, 5, 2

(d) 4, 1, 2, 3, 5

(e) 4, 1, 2, 5, 3

35

Quanto à interpretação da Escala de Coma de Glasgow (ECG), no que se refere ao trauma cranioencefálico, o parâmetro que indica estado de coma é

- (a) ECG entre 6 e 12.
- (b) ECG entre 9 e 12.
- (c) ECG entre 13 e 15.
- (d) ECG entre 11 e 15.
- (e) ECG menor ou igual a 7.

Numere a 2ª coluna de acordo com a 1ª, quanto aos isolamentos e, após, assinale a alternativa com a seqüência correta.

1ª COLUNA

1. Isolamento Estrito
2. Isolamento de Contato
3. Isolamento Respiratório
4. Precauções Entéricas

2ª COLUNA

- () Quarto privativo, uso de máscaras para contatos próximos, avental, luvas para tocar material infectado.
- () Uso de avental no cuidado direto, luvas para lidar com material infectado.
- () Quarto privativo, máscaras, avental e luvas para todas as pessoas que entram no quarto, todos os objetos embalados ou desprezados.
- () Quarto privativo, uso de máscaras para contatos próximos, lavagem das mãos.

- (a) 3, 1, 2, 4
 (b) 4, 3, 2, 1
 (c) 1, 3, 4, 2
 (d) 2, 4, 1, 3
 (e) 2, 4, 3, 1

37

Em relação ao tratamento com quimioterápicos, analise as afirmativas a seguir.

- I) São chamadas de quimioterápicos drogas antiblásticas ou citostáticas.
- II) Os quimioterápicos atuam nos diversos ciclos da reprodução celular.
- III) A maior parte das drogas usadas atualmente tem ação sistêmica, atuando nas células normais e cancerígenas.
- IV) As drogas antiblásticas somente podem ser administradas por via endovenosa e intramuscular.

Estão corretas

- (a) somente as afirmativas II, III e IV.
 (b) as afirmativas I, II, III e IV.
 (c) somente as afirmativas I e II.
 (d) somente as afirmativas I, II e III.
 (e) somente as afirmativas III e IV.

Quanto aos cuidados referentes à aferição da pressão arterial, analise as seguintes afirmativas.

- I) O paciente deve evitar o uso de cigarro e bebidas com cafeína nos trinta minutos precedentes à aferição.
- II) Na primeira aferição, o enfermeiro deve medir a pressão nos dois braços do paciente. Se as medidas forem discrepantes, o enfermeiro deve considerar o valor mais alto.
- III) A câmara inflável deve cobrir pelo menos dois terços da circunferência do braço.
- IV) O enfermeiro deve sentar o paciente com o braço apoiado na altura do precórdio.
- V) O enfermeiro deve palpar o pulso braqueal do paciente e inflar o manguito de 20 a 30 mmHg acima do valor em que o pulso deixar de ser sentido.

Está(ão) correta(s)

- (a) somente as alternativas I, II, e III.
 (b) somente as alternativas I, II, III, e IV.
 (c) somente as alternativas I, II, III e V.
 (d) somente as alternativas I e V.
 (e) todas as alternativas.

39

O enfermeiro deve considerar, em seu plano terapêutico, os perigos da oxigenoterapia e os procedimentos de segurança. Associe as terapias abaixo com os possíveis riscos ou complicações.

1. Exposição prolongada ao oxigênio em concentração elevada e prolongada
 2. Pressão exacerbada e prolongada nas paredes da traquéia por balão inflável
 3. Uso de pressões hiperbáricas
 4. Uso de oxigenoterapia por máscara
- () O oxigênio pode causar intoxicação do sistema nervoso central
- () Pode acarretar isolamento por comunicação ineficaz
- () Dificulta a oxigenação, podendo resultar em necrose
- () Causa edema, hemorragia e necrose dos alvéolos pulmonares

A seqüência correta para a 2ª coluna, é

- (a) 2, 3, 1, 4
 (b) 3, 4, 2, 1
 (c) 1, 2, 3, 4
 (d) 4, 1, 2, 3
 (e) 2, 1, 3, 4

40

Durante a amamentação, algumas lactentes se referem a contrações uterinas. Isso decorre devido à

- (a) liberação de estrógeno pelo estímulo mamário.
- (b) produção de tiroxina pela tireóide pelo estímulo mamário.
- (c) liberação de ocitocina pelo estímulo da sucção.
- (d) liberação de progesterona por estímulo da sucção.
- (e) produção de prolactina e somatotrofina pela hipófise, provocada pela sucção.

41

Assinale a alternativa que completa as lacunas corretamente

O hormônio antidiurético, presente no organismo humano, é conhecido como _____. Ele é secretado pela glândula _____ para controlar a regulação da excreção de água pelos rins. A deficiência desse hormônio causa a patologia chamada de _____.

- (a) ADH – hipófise anterior – diabetes insípido
- (b) ocitocina – hipotálamo – diabetes melito
- (c) paratormônio – supra-renais – hipoparatiroidismo
- (d) vasopressina – hipófise posterior – diabetes insípido
- (e) tiroxina – tireóide – hipotiroidismo

42

A classificação preconizada pelo Ministério da Saúde, para artigos e áreas hospitalares, é a seguinte:

1ª coluna

1. Artigos críticos
2. Artigos semicríticos
3. Artigos não-críticos
4. Áreas semicríticas
5. Áreas críticas
6. Áreas não-críticas

2ª coluna

- () Cateteres vesicais, endoscópios, equipamentos de assistência ventilatória.
- () Sanitários, corredores, elevadores, depósitos.
- () Enfermarias, salas de exames, ambulatórios.
- () Soluções injetáveis, instrumentos cirúrgicos, roupas utilizadas em grande queimado.
- () Sala de parto, unidade de queimado.

() Comadres e bacias, equipamentos de hidroterapia, microscópios cirúrgicos.

- (a) 1-6-5-3-4-2
- (b) 2-6-4-1-5-3
- (c) 2-5-4-1-6-3
- (d) 3-4-6-1-5-2
- (e) 1-5-4-2-6-3

43

Os cuidados de enfermagem prestados a pacientes no pós-operatório imediato, com o objetivo de prevenir o aparecimento de choque e hipoxemia, devem ter como prioridade a aferição e a avaliação freqüentes dos seguintes parâmetros:

- (a) ventilação pulmonar/ sinais vitais / funcionamento de tubos, drenos, cateteres e infusões.
- (b) presença de febre e dor/funcionamento da hidratação venosa/cicatrização da ferida cirúrgica.
- (c) capacidade de deambulação / pulso e pressão arterial/capacidade pulmonar com exercício respiratório.
- (d) volume urinário / presença de náuseas e vômitos/ capacidade de movimento no leito.
- (e) pressão venosa central/respiração e temperatura/ presença de secreção e sangue.

44

O amolecimento do colo uterino é conhecido como

- (a) Sinal de Goodell.
- (b) Sinal de Oslander.
- (c) Sinal de Jackmier.
- (d) Segmento inferior.
- (e) Segmento superior.

45

Um paciente de 85 anos de idade apresenta uma fratura no quadril direito. Ele foi admitido com uma história de 48 horas de vômitos, diarreia e perda de peso. **Com base nessa informação, o enfermeiro deve monitorar o paciente cuidadosamente quanto à**

- (a) hipertensão.
- (b) anasarca.
- (c) hipocalemia.
- (d) diminuição do nível sérico de creatinina.
- (e) Nenhuma das alternativas está correta.